

## Gebrauchsinformation

### Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostraße 24  
76227 Karlsruhe  
www.dhu.de



# Metrovetsan®-N

Flüssige Verdünnung zur Injektion für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen

Homöopathisches Arzneimittel für Tiere

### Zusammensetzung

1 Ampulle zu 5 ml (5 g) enthält:

*Wirkstoffe:* Pulsatilla Dil. D2 50 mg, Sepia officinalis purificata Dil. D4 (HAB, V.4b) 50 mg.

*Sonstige Bestandteile:* Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

### Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den veterinär-homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

- chronische Gebärmutterentzündung (Endometritis) I. und II. Grades
- Erzeugung einer therapeutischen Hyperämie im Genitaltrakt bei Sterilität ohne klinischen Befund
- unterstützend bei der offenen Form der Gebärmuttervereiterung (Pyometra) der Hündin
- Regulierung hormonell bedingter Dysfunktion
- Beschleunigung der Gebärmutterrückbildung (Uterusinvolution) nach Kaiserschnitten
- bei Verzögerung der Reinigung nach der Geburt und nach Nachgeburtsverhaltung (Retentio secundinarum)

### Gegenanzeigen

Metrovetsan®-N darf nicht angewendet werden bei:

- der geschlossenen Form der Gebärmuttervereiterung (Pyometra) der Hündin
- Welpen und Jungtieren
- einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Arzneimittels

### Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Hinweis:

Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

### Zieltierarten

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Zur subkutanen Anwendung.

Rinder:	15 ml	s.c.
Pferde:	15 ml	s.c.
Schweine:	10 ml	s.c.
Schafe:	5 ml	s.c.
Ziegen:	5 ml	s.c.
Hunde:	1 – 2 ml	s.c.
Katzen:	1 – 2 ml	s.c.

Zur einmaligen Behandlung, die nötigenfalls in Abständen von 1 bis 2 Tagen 2- bis 3-mal wiederholt werden kann.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne tierärztlichen Rat nicht über längere Zeit verabreicht werden.

### **Hinweise für die richtige Anwendung**

Subkutane Injektionen sollten von Tierhaltern erst nach entsprechender fachlicher Unterweisung durch den Tierarzt vorgenommen werden.

Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum von ca. 30 Minuten zu beobachten, um bei Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion sofort den Tierarzt verständigen zu können.

### **Wartezeit**

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege:

Essbare Gewebe:

0 Tage

Pferd, Rind, Schaf, Ziege:

Milch:

0 Tage

### **Besondere Lagerungshinweise**

Arzneimittel sollen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!

Nicht über 25 °C lagern.

Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

### **Besondere Warnhinweise**

Vor der Anwendung von Metrovetsan®-N sollten die Erkrankung und ihre Ursachen tierärztlich abgeklärt sein. Die Anwendung ersetzt nicht andere vom Tierarzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, insbesondere bei Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens, sollte tierärztlicher Rat eingeholt werden.

Aufgrund der Risiken einer parenteralen Applikation eines Arzneimittels ist die Gabe eines Arzneimittels mit gleicher Wirkungsweise, das für die orale oder rektale Applikation zugelassen ist, vorzuziehen.

### **Anwendung während der Trächtigkeit und der Laktation**

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

Während der Anwendung von Metrovetsan®-N sollte keine Uterusspülung mit jodhaltigen Lösungen durchgeführt werden. Falls erforderlich kann die Spülung 8 Tage nach Abschluss der Behandlung vorgenommen werden.

Die gleichzeitige Gabe eines unverträglichen Arzneimittels, welches die Wirkung von Metrovetsan®-N aufheben könnte, ist zu vermeiden. Fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

### **Datum der Fassung der Packungsbeilage**

Juli 2007

---

### **Darreichungsform und Packungsgrößen**

Originalpackung mit 20 Ampullen zu 5 ml

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6402655.00.00